

呼120 CBDCA/PEM+アミバンタマブ療法【体重80kg未満:2コース目用】 49-07-0300  
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)〔アミバン後発〕 デキサート注射液6.6mg2mL〔デキサート静注後発〕 *（腎）ガスター注射液２０mg（２０mg 2ml） ボララミン注５mg（1mL） 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて	１ 瓶 1.5 V １ A １ A １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	アセリオ静注液１００mgバッグ（100mL）  15 分かけて	１ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	生理食塩液（５０mL）  15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	ライブリバント点滴静注(アミバンタマブ) 輸液（自動計算）  125mL/H ※点滴ルートに0.2ミクロンのインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(全量250mLに調製)－	1400 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	生理食塩液（５０mL）  15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	ペメトレキセド注（アミバン後発） 生理食塩液（１００mｌ）  10 分かけて 【内服】バンビタン末(1g) 1日1回,1回1包,連日 －薬剤部調製－	500 mg/m <sup>2</sup> １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
008 注射	カルボプラチン点滴(パラプラチン後発) ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ）  60 分かけて (MAX:750mg/body) －薬剤部調製－	5 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：デキサート錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回 【注射】ボララミン注(500μg) 1回2A,筋肉注射,9週毎 【注意】2コース目専用のレジメンです。				