

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	■アロキシ静注（0. 7 5 mg／5 mL） デキサート注射液6. 6mg2mL [ﾃﾞｭｰｸﾃﾞｭｰｸ注後発] 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶 1. 5 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
003 注射	ロゼウス静注ﾋﾞﾌﾙﾋﾞﾝ(ﾎﾟﾙﾋﾞﾝ後発) 生理食塩液（５０mL） 全開で －薬剤部調製－	25 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	塩化〔N a〕「補正液」1 mEq/mL (20mL) ﾘｽｸ 硫酸M g 補正液1mEq／mL（２０mL） ソルデム３A 輸液（５００mｌ） 60 分かけて 【内服】ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄCap (125mg) 1Cap（ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注開始60 分前）	20 ml 8 ml １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	
005 注射	マンニトール注（２０％３００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
006 注射	シスプラチン点滴静注(ﾗﾝﾀﾞｰ) 生理食塩液「テルモ」（１１） 2 時間で滴下 【要】遮光 －薬剤部調製－	80 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	
007 注射	塩化〔N a〕「補正液」1 mEq/mL (20mL) ソルデム３A 輸液（５００mｌ） 60 分かけて	20 ml １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day1)：ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄCap (125mg) 1回1Cap、1日1回 (ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注開始60分前) 制吐療法 (Day2-3)：ﾌﾟﾛﾍﾟﾝﾄCap (80mg) 1回1Cap、1日1回 制吐療法 (Day2-4)：ﾃﾞｭｰｸﾃﾞｭｰｸ錠 (0. 5mg) 1回8錠、1日2回（朝昼）					