呼119 CBDCA/PEM＋ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ療法【体重80kg未満:1ｺｰｽ目用】　49-07-0290

レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
002 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)[ｱﾛｷｼ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] ＊(腎)ガスター注射液２０ｍｇ（２０mg２ml） ポララミン注５ｍｇ（1mL） 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶 3 Ｖ 1 Ａ 1 Ａ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●			
003 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] ＊(腎)ガスター注射液２０ｍｇ（２０mg２ml） ポララミン注５ｍｇ（1mL） 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1.5 Ｖ 1 Ａ 1 Ａ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●	●
004 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） 15　分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
005 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
006 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） (50mL/Hで2時間、その後、75mL/Hで終了まで) ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mLに調製)ー	350 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1	●			
007 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） (33mL/Hで2時間、その後、50mL/Hで終了まで) ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mLに調製)ー	1050 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1		●		
008 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） 65mL/H ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mLに調製)ー	1400 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1			●	
009 注射	ライブリバント点滴静注(ｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ) 輸液（自動計算） 85mL/H ※点滴ﾙｰﾄにO.2ﾐｸﾛﾝのｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用 ー薬剤部調製(全量250mLに調製)ー	1400 mg/body 自動	化学療法点滴 メイン1				●
010 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●			
011 注射	ペメトレキセド注（ｱﾘﾑﾀ後発） 生理食塩液（１００ｍｌ） 10　分かけて 【内服】ﾊﾟﾝﾋﾞﾀﾝ末(1g) 1日1回,1回1包,連日 ー薬剤部調製ー	500 mg/㎡ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●			
012 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ後発) ブドウ糖注射液（　５％２５０ｍｌ） 60　分かけて (MAX:750mg/body) ー薬剤部調製ー	5 AUC 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●			

【レジメンコメント】

制吐療法(Day3)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回

【注射】ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ注(500μg) 1回2A,筋肉注射,9週毎

【注意】1コース目(初回治療)専用のレジメンです。