

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	イジュド点滴静注(トレリムマブ) 生理食塩液（２５０mL） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(最終濃度:0.1～10mg/mL)－	75 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	イミフィンジ点滴(デュルバルマブ) 生理食塩液（２５０mL） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※体重が30kg以下の場合、20mg/kg －薬剤部調製(最終濃度:1～15mg/mL)－	1500 mg/body １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [アロキ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [デカトロン後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	ペメトレキセド注 (アリムダ後発) 生理食塩液（１００mｌ） 10 分かけて 【内服】パンプキナム末(1g) 1日1回, 1回1包, 連日 －薬剤部調製－	500 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
008 注射	カルボプラチン点滴(パラプラチン後発) ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	6 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 ※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg 制吐療法 (Day2-3)：デカトロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回 【注射】メコナミン注(500μg) 1回2A, 筋肉注射, 9週毎				