# 呼086 CBDCA/nab-PTX＋アテゾリズマブ療法　49-07-0210

## レジメン期間：21日

| Rp | 薬品／コメント | 投与量 | 用法／手技・ルート | Day 1 | Day 8 | Day 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 注射 | 生理食塩液（１００ｍｌ）<br><br>ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ用<br>※ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰの使用（ﾃｾﾝﾄﾘｸ⇒必要。ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ⇒不可。） | 1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | |
| 002 注射 | 生理食塩液（１００ｍｌ）<br><br>ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ用 | 1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | | ● | ● |
| 003 注射 | テセントリク点滴(ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ)<br>生理食塩液（２５０ｍＬ）<br><br>60　分かけて<br>（初回時60分、2回目以降30分）<br>※点滴ルートにインラインフィルターを使用<br>－薬剤部調製－ | 1200 mg/body<br>1 袋 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | |
| 004 注射 | 生理食塩液（５０ｍＬ）<br><br>15　分かけて | 1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | |
| 005 注射 | ■アロキシ静注（０．７５mg／５mL）<br>デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発]<br>生理食塩液（１００ｍｌ）<br><br>30　分かけて | 1 瓶<br>1 Ｖ<br>1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | |
| 006 注射 | デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発]<br>生理食塩液（１００ｍｌ）<br><br>30　分かけて | 1 Ｖ<br>1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | | ● | ● |
| 007 注射 | 生理食塩液（５０ｍＬ）<br><br>全開で | 1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | ● | ● |
| 008 注射 | アブラキサン点滴静注(ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ)<br>生理食塩液（５０ｍＬ）<br><br>30　分かけて<br>※点滴ルートにインラインフィルターを使用しない<br>－薬剤部調製(1V/20mlで調製。残りの生食は廃棄)－ | 100 mg/㎡<br>40 ml | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | ● | ● |
| 009 注射 | 生理食塩液（５０ｍＬ）<br><br>全開で | 1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | |
| 010 注射 | カルボプラチン点滴(ﾊﾟﾗﾌﾞﾗﾁﾝ)<br>ブドウ糖注射液（　５%２５０ｍｌ）<br><br>60　分かけて<br>－薬剤部調製－ | 6 AUC<br>1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | |

【レジメンコメント】

制吐療法(Day2-3)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回

※点滴ルートのインラインフィルター有無に注意

テセントリク⇒ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用、アブラキサン⇒ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用不可