

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	オブジーボ点滴静注(ニボルマブ) 生理食塩液（５０mL） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(最終濃度0.35mg/mL以上)－	360 mg/body １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	ボラミン注５mｇ（1mL） (腎)ガスター注射液２０mg（２０mg2ml） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ A １ A 3 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [ｱﾛｷｼ後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	パクリタキセル注(ｷｷｼｰﾙ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） 3 時間で滴下 （※点滴ルートにインラインフィルターを使用） －薬剤部調製－	200 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾞﾗﾌﾞﾗﾁﾝ後発) ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	6 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回 ※最大3コースまで				