

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注（ペムブロリズマブ） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：1～10mg/mL）－	200 mg/body １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	■アロキシ静注（0. 75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [テカトロン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	アリムタ注（ペトリセト） 生理食塩液（１００mｌ） 10 分かけて 【内服】パルビチン末（1g） 1日1回, 1回1包, 連日 －薬剤部調製－	500 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	カルボプラチン点滴（パワラチン） ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	5 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：テカトロン錠（0.5mg） 1回8錠、1日2回 【注射】メコパミン注（500μg） 1回2A, 筋肉注射, 9週毎				