

泌064 パドセブ+ペムブロリズマブ併用療法 35-05-0110
 レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	パドセブ点滴静注(エンルツマブ®ドリン) 注射用水（２０mｌ トラボトル） 生理食塩液（５０mｌ） 30 分かけて ※30mg製品：注水3.3mL/1Vで溶解 → 10mg/mL ※20mg製品：注水2.3mL/1Vで溶解 → 10mg/mL ※体重100kg以上の場合は、100kgで投与量を計算すること。 －薬剤部調製(最終濃度0.3～4mg/mL)－	1.25 mg/kg 1 A 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	生理食塩液（５０mｌ） 30 分かけて (初回時 30分、前回投与の忍容性が良好であった場合、 15分で可)	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	キイトルーダ点滴静注(ペム®ロリズマブ®) 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(最終濃度：1～10mg/mL)－	200 mg/body 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
005 注射	生理食塩液（５０mｌ） 全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
【レジメンコメント】 ※体重100kg以上の場合は、100kgで投与量を計算すること。					