

呼127 タルラタマブ単剤療法【サイクル1 Day1】 49-01-0070
レジメン期間：7日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ボララミン注５mｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL [デキソ注後発] 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ A 1.25 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（５０mL） 全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	イムデトラ点滴静注(タルタマブ) 注射用水（５mｌ） 冷限 安定化液4デトラ用7mL (SPD払出不要) 生理食塩液（２５０mL） 60 分かけて (イムデトラ1mgを注水1.3mLで溶解→0.9mg/mL) 一薬剤部調製(全量250.1mlに調製)－	1 mg/body 1.3 ml 13 ml 236 ml	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	生理食塩液（５０mL） 全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	生理食塩液「テルモ」（１ｌ） 4 時間で滴下	１ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 ※1日目及び8日目は、必ず入院管理すること。 ※15日目以降の投与後も患者の状態に応じて入院管理を検討すること。 G3以下のサイトカイン放出症候群が出現した場合、回復するまで休薬 G3のサイトカイン放出症候群が再発した場合、投与中止 G4のサイトカイン放出症候群が出現した場合、投与中止 ※休薬後に再開する時、以下の場合、【サイクル1 Day1】の投与方法に戻して順に始めること。 最終投与日が1日目:1mg で休薬期間が14日を超える場合 最終投与日が8日目:10mg で休薬期間が21日を超える場合 最終投与日が15日目以降:10mg で休薬期間が28日を超える場合				