呼097 CDDP/VP-16＋ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ療法(short hydration)【体重＞30kg】　49-02-0090

レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 3
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	イミフィンジ点滴(ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ) 生理食塩液（２５０ｍＬ） 60　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※体重が30kg以下の場合、20mg/kg －薬剤部調製(最終濃度:1～15mg/mL)－	1500 mg/body 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		
003 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
004 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)[ｱﾛｷｼ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶 1.5 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
005 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●
006 注射	エトポシド点滴静注液(ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞ) ブドウ糖注射液（　５％５００ｍｌ） 90　分かけて －薬剤部調製－	100 mg/㎡ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
007 注射	塩化[Ｎａ]｢補正液｣１mEq/mL(20mL) ﾘｽｸ 硫酸Ｍｇ補正液1mEq／mL(２０mL) ソルデム３Ａ　輸液（５００ｍｌ） 60　分かけて 【内服】ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄCap(125mg) 1Cap (ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注開始60分前)	20 ml 8 ml 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		
008 注射	マンニットール注（２０％３００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
009 注射	シスプラチン点滴静注(ﾗﾝﾀﾞ) 生理食塩液「テルモ」（１ｌ） 2　　時間で滴下 【要】遮光 －薬剤部調製－	80 mg/㎡ 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		
010 注射	塩化[Ｎａ]｢補正液｣１mEq/mL(20mL) ソルデム３Ａ　輸液（５００ｍｌ） 60　分かけて	20 ml 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		

【レジメンコメント】

制吐療法(Day1)：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注開始60分前)

制吐療法(Day2-3)：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄCap(80mg) 1回1Cap、1日1回

制吐療法(Day4)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回 (朝昼)

※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg