# 呼098 CBDCA/VP-16＋ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ療法【体重＞30kg】　49-03-0060

## レジメン期間：21日

| Rp | 薬品／コメント | 投与量 | 用法／手技・ルート | Day 1 | Day 2 | Day 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 注射 | 生理食塩液（１００ｍｌ）<br><br>ルートキープ用 | 1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | ● | ● |
| 002 注射 | イミフィンジ点滴(ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ)<br>生理食塩液（２５０ｍＬ）<br><br>60　分かけて<br>※点滴ルートにインラインフィルターを使用<br>※体重が30kg以下の場合、20mg/kg<br>－薬剤部調製(最終濃度:1～15mg/mL)－ | 1500 mg/body<br>1 袋 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | |
| 003 注射 | 生理食塩液（５０ｍＬ）<br><br>15　分かけて | 1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | |
| 004 注射 | パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)[ｱﾛｷｼ後発]<br>デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発]<br>生理食塩液（１００ｍｌ）<br><br>30　分かけて | 1 瓶<br>1 Ｖ<br>1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | |
| 005 注射 | デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発]<br>生理食塩液（１００ｍｌ）<br><br>30　分かけて | 1 Ｖ<br>1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | | ● | ● |
| 006 注射 | エトポシド点滴静注液(ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞ)<br>生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ）<br><br>90　分かけて<br>－薬剤部調製－ | 100 mg/㎡<br>1 袋 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | ● | ● |
| 007 注射 | カルボプラチン点滴(ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ)<br>ブドウ糖注射液（　５％２５０ｍｌ）<br><br>60　分かけて<br>－薬剤部調製－ | 6 AUC<br>1 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ● | | |

【レジメンコメント】
※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg