呼113 CBDCA/VP-16＋ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ療法【体重＞30kg】(高齢又はPS2)　49-03-0065

レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 3
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	イミフィンジ点滴(ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ) 生理食塩液（２５０ｍＬ） 60　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 ※体重が30kg以下の場合、20mg/kg －薬剤部調製(最終濃度:1～15mg/mL)－	1500 mg/body 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		
003 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
004 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)[ｱﾛｷｼ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶 1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
005 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●
006 注射	エトポシド点滴静注液(ﾍﾞﾌﾟｼﾄﾞ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） 90　分かけて －薬剤部調製－	80 mg/㎡ 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
007 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ後発) ブドウ糖注射液（　５％２５０ｍｌ） 60　分かけて －薬剤部調製－	5 AUC 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		

【レジメンコメント】
※体重が30kg以下の場合、イミフィンジは 20mg/kg