

血292 Pola-BR療法【2日レジメン】(2コース目以降) 05-02-3320
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 【内服】ホウラン錠(2mg) １錠、ロキソプロフェン錠(60mg) １錠 (リツキシマブ 開始30分前に)	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
002 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1		●
003 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [70分後発] デキサート注射液6.6mg2mL [70分後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [70分後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて	１ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1		●
005 注射	トリアキシン点滴静注(ハンダムシチン) 生理食塩液（２５０ｍｌ） 60 分かけて －薬剤部調製－	90 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	生理食塩液（５０ｍｌ） 全開で	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
007 注射	リツキシマブBS(リツキシン後発) 生理食塩液「テルモバック」（５００ｍｌ） 生理食塩液（２０ｍｌ プラボトル） (初回:50mL/h・2回目以降:100mL/hから開始し、30分毎 に速度を上げる。最大400mL/hまで。) －薬剤部調製－	375 mg/m ² １ 袋 １ A	化学療法点滴 メイン1	●	
008 注射	生理食塩液（５０ｍｌ） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
009 注射	ボライビー点滴静注(ホウランマブヘドチン) 注射用水（２００ｍｌ プラボトル） ブドウ糖注射液（５％１００ｍｌ） 30 分かけて (初回時 90分、2回目以降30分) ※点滴ルートに0.2ミクロンのインラインフィルターを 使用 (140mg製品：注水7.2mL/1V, 30mg製品：注水1.8mL/1Vで 溶解→20mg/mL) －薬剤部調製(最終濃度0.72～2.7mg/mL)－	1.8 mg/kg １ A 0.5 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
【レジメンコメント】 【内服】ホウラン錠(2mg) １錠、ロキソプロフェン錠(60mg) １錠 Day1（リツキシマブ開始30分前に） ※初回時は、Pola-BR療法【3日レジメン】を使用すること！！					