

血312 ガザイバ/トレアキシン療法(2コース目以降)【投与時間短縮用】 05-02-2920
レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 【内服】ホ`ラミン錠(2mg) 1錠、ロキソ`ロフィン錠(60mg) 1錠	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
002 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●
003 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [アロキシ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [テ`カト`ロ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて	1 瓶 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [テ`カト`ロ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30 分かけて	1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●
005 注射	トレアキシン点滴静注(ヘ`ンダ`ムスチン) 生理食塩液（５０ｍＬ） 10 分かけて －薬剤部調製－	90 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
007 注射	ガザイバ点滴静注(ホ`スツ`マフ`) 生理食塩液（２０ｍｌ プラボトル） 生理食塩液（２５０ｍＬ） (30mL/hで開始し、30分後に270mL/hに速度を上げる。) ※点滴ルートに0.22ミクロン以下のインラインフィルターを使用 －薬剤部調製－	1000 mg/body 1 A 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	
【レジメンコメント】 【内服】 ホ`ラミン錠(2mg) 1錠、ロキソ`ロフィン錠(60mg) 1錠 Day1(ガ`ザ`イバ`注開始30分前) ※前回の投与で、infusion reactionが、G2以下の場合に、使用可能。					