

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 3
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	■アロキシ静注（0. 75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 60 分かけて	１ 瓶 5 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
003 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 60 分かけて	5 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●
004 注射	イホマイド注射用（ｲｽﾌﾟﾗﾐﾄﾞ） メイロン（7%20mｌ） ソルデム3A 輸液（500mｌ） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	1500 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
005 注射	ウロミテキサン注 生理食塩液（１００mｌ） 側管から 30 分かけて （イホマイド開始時）	300 mg/m <sup>2</sup> １ 瓶	化学療法点滴 サイド1	●	●	●
006 注射	エトポシド点滴静注液（ｴﾂﾌﾟｼﾄﾞ） ブドウ糖注射液（ 5%500mｌ） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	100 mg/m <sup>2</sup> １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
007 注射	カルボプラチン点滴（ｶﾞﾗﾌﾞﾗﾁﾝ） 生理食塩液「テルモパック」（500mｌ） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	300 mg/m <sup>2</sup> １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●		
008 注射	ウロミテキサン注 生理食塩液（１００mｌ） 側管から 30 分かけて （イホマイド開始、4時間後）	300 mg/m <sup>2</sup> １ 瓶	化学療法点滴 サイド1	●	●	●
009 注射	ウロミテキサン注 生理食塩液（１００mｌ） 側管から 30 分かけて （イホマイド開始、8時間後）	300 mg/m <sup>2</sup> １ 瓶	化学療法点滴 サイド1	●	●	●