

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注（ペムパロキサマブ） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：1～10mg/mL）－	200 mg/body １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	ボラミン注5mg（1mL） ＊（腎）ガスター注射液２０mg（２０mg2ml） デキサート注射液6.6mg2mL [テカトロン注後発] 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ A １ A 3 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	パロノセトロン静注（0.75mg/5mL）[アロキ後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	パクリタキセル注（キソール後発） 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） 3 時間で滴下 （※点滴ルートにインラインフィルターを使用） <LO:175mg/m ² , L1:135mg/m ² , L2:110mg/m ² > －薬剤部調製－	175 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	カルボプラチン点滴（パラプラチン後発） ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて (max:750mg/body) <LO:AUC=5, L1:AUC=4, L2:AUC=3> －薬剤部調製－	5 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：テカトロン錠（0.5mg）１回8錠、１日2回				