

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００m l） ルートキープ用 ９：４５	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ポララミン注5 m g（1mL） （腎）ガスター注射液２０m g（２０mg 2 ml） デキサート注射液6. 6mg 2mL [ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（５０m L） 15 分かけて ９：４５	１ A １ A ３ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	■アロキシ静注（0. ７５mg／5 mL） 生理食塩液（１００m l） 30 分かけて １０：００	１ 瓶 １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	パクリタキセル注(ﾎﾟｸﾘｰﾙ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００m l） 3 時間で滴下 （※点滴ﾚｰﾄにｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰを使用）１０：３０ <L0:175mg/m ² , L1:135mg/m ² , L2:110mg/m ² > －薬剤部調製－	175 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾞｰﾗﾌﾞﾗﾁﾝ) ブドウ糖注射液（５％２５０m l） 60 分かけて (max:1, 000mg/body) １３：３０ <L0:AUC=6, AUC=5, L2:AUC=4> －薬剤部調製－	6 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：ﾃﾞｭｶﾞｰﾄﾞﾝ錠 (0. 5mg) １回8錠、１日2回				