消107 RAM/weekly nab-PTX療法　49-14-0300
レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ﾙｰﾄｷｰﾌﾟ用　※ｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰの使用（ｻｲﾗﾑｻﾞ⇒必要。ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ⇒不要。）	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 A 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●
003 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●
004 注射	サイラムザ点滴静注(ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ) 生理食塩液（２５０ｍＬ） 60　分かけて （初回時60分、2回目以降30分） ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製－	8 mg/kg 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		●
005 注射	デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	
006 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
007 注射	アブラキサン点滴静注(ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ) 生理食塩液（５０ｍＬ） 30　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用しない －薬剤部調製(1V/20mlで調製。残りの生食は廃棄)－	100 mg/㎡ 40 ml	化学療法点滴 メイン1	●	●	●

【レジメンコメント】
※点滴ルートのインラインフィルター有無に注意
サイラムザ⇒点滴ルートにインラインフィルターを使用する
アブラキサン⇒点滴ルートにインラインフィルターを使用しない