

消054 か°シビ°ン/CDDP療法【XP療法】（short hydration） 49-14-0132
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100ml） ルートキープ用 【内服】Day1-14 か°シビ°ン錠、2,400～4,200mg/分 2/day(朝夕食後<30分以内>)	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	■アロキシ静注(0.75mg/5mL) デキサート注射液6.6mg2mL [テ°カ°ロン注後発] 生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 瓶 1.5 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	塩化[N a]「補正液」1mEq/mL(20mL) リソ 硫酸M g 補正液1mEq/mL（20mL） ソルデム3A 輸液（500ml） 60 分かけて 【内服】ア°レ°タントCap(125mg) 1Cap（シス°ラチン注開始60分前）	20 ml 8 ml 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	マンニトール注（20%300ml） 30 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	シスプラチン点滴静注(ランタ°) 生理食塩液「テルモ」（1l） 2 時間で滴下 【要】遮光 ー薬剤部調製ー	80 mg/m ² 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	塩化[N a]「補正液」1mEq/mL(20mL) ソルデム3A 輸液（500ml） 60 分かけて	20 ml 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法(Day1)：ア°レ°タントCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(シス°ラチン注開始60分前) 制吐療法(Day2-3)：ア°レ°タントCap(80mg) 1回1Cap、1日1回 制吐療法(Day2-4)：テ°カ°ロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回（朝昼）				