

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】Day1-14 カ [°] シ [°] ビ [°] ン錠、2,400～4,200mg/分 2/day(朝夕食後<30分以内>)	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	トラスツズマブBS注(ハ [°] セ [°] ブ [°] チ [°] ン) 注射用水（２０mｌ トラボトル） 生理食塩液（２５０mｌ） 30 分かけて （初回時 90分、2回目以降30分） <初回時:8mg/kg, 2回目以降:6mg/kg> (150mg製品：注水7.2mL/1Vで溶解。60mg製品：注水 3mL/1Vで溶解。) －薬剤部調製－	6 mg/kg 1 A 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	■アロキシ静注(0. 7 5 mg／5 mL) デキサート注射液6.6mg2mL [デ [°] カ [°] ト [°] ン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	1 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	オキサリプラチン点滴(エル [°] ラット) ブドウ糖注射液（５％５００mｌ） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	130 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法(Day2-3)：デ [°] カ [°] ト [°] ン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回（朝夕）				