

消089 TS-1+HCN/CDDP療法【3週毎】short hydration 49-14-0218
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】Day1～14 TS-1Cap、80～120mg/分2/day(朝夕食後)	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	トラスツズマブBS注(ハセブチン) 注射用水（２０mｌプラボトル） 生理食塩液（２５０mｌ） 30 分かけて (初回時 90分) <初回時:8mg/kg, 2回目以降:6mg/kg> (150mg製品：注水7.2mL/1Vで溶解。60mg製品：注水3mL/1Vで溶解。) －薬剤部調製－	6 mg/kg 1 A 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	■アロキシ静注(0. 75mg／5mL) デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（５０mｌ） 15 分かけて	1 瓶 1.5 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	塩化〔N a〕〔補正液〕1mEq/mL(20mL) リスカ 硫酸M g 補正液1mEq/mL(２０mL) ソルデム3 A 輸液（５００mｌ） 60 分かけて 【内服】ﾌﾟﾚﾐｱﾝﾄCap(125mg) 1Cap (ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注開始60分前)	20 ml 8 ml 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	マンニトール注（２０％３００mｌ） 30 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	シスプラチン点滴静注(ﾗﾝﾀﾞｰ) 生理食塩液「テルモ」（１ l） 2 時間で滴下 【要】遮光 －薬剤部調製－	60 mg/m ² 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	塩化〔N a〕〔補正液〕1mEq/mL(20mL) ソルデム3 A 輸液（５００mｌ） 60 分かけて	20 ml 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day1)：ﾌﾟﾚﾐｱﾝﾄCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注開始60分前) 制吐療法 (Day2-3)：ﾌﾟﾚﾐｱﾝﾄCap(80mg) 1回1Cap、1日1回 制吐療法 (Day2-4)：ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回（朝昼）				