

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用 【内服】Day-7～14 TS-1Cap、80～120mg/分2/day（朝夕食後）	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	■アロキシ静注（0.75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [テカトロン注後発] 生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 瓶 1.5 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	塩化[Na][補正液]1mEq/mL(20mL) リソ 硫酸Mg補正液1mEq/mL（20mL） ソルデム3A 輸液（500mL） 60 分かけて 【内服】77レビタントCap(125mg) 1Cap（シスプラチン注開始60分前）	20 ml 8 ml 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	マンニトール注（20%300mL） 30 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	シスプラチン点滴静注(ランタ) 生理食塩液「テルモ」（1L） 2 時間で滴下 【要】遮光 ー薬剤部調製ー	60 mg/m ² 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	塩化[Na][補正液]1mEq/mL(20mL) ソルデム3A 輸液（500mL） 60 分かけて	20 ml 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day1)：77レビタントCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(シスプラチン注開始60分前) 制吐療法 (Day2-3)：77レビタントCap(80mg) 1回1Cap、1日1回 制吐療法 (Day2-4)：テカトロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回（朝昼）				