

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用 【内服】Day1-14 TS-1Cap、80～120mg/分2/day（朝夕食後）	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注（ ^レ ム ^フ ロ ^ス マ ^フ ） 生理食塩液（100mL） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：1～10mg/mL）－	200 mg/body 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	パロノセトロン静注（0.75mg/5mL）[70 ^分 後発] デキサート注射液6.6mg2mL [7 ^分 後発] 生理食塩液（100mL） 30 分かけて	1 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	オキサリプラチン点滴（エル ^ラ ット後発） ブドウ糖注射液（5%500mL） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	130 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●