

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】Day1-14 TS-1Cap、80～120mg/分2/day（朝夕食後）	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	トラスツズマブBS注（ハセブチン） 注射用水（２０mｌプラボトル） 生理食塩液（２５０mｌ） 30 分かけて （初回時 90分、2回目以降30分） <初回時:8mg/kg, 2回目以降:6mg/kg> (150mg製品：注水7.2mL/1Vで溶解。60mg製品：注水3mL/1Vで溶解。) －薬剤部調製－	6 mg/kg 1 A 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	■アロキシ静注（0. 75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [デカトロン注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	オキサリプラチン点滴（エルプラット） ブドウ糖注射液（５％５００mｌ） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	130 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：デカトロン錠（0.5mg） 1回8錠、1日2回				