

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL）  ルートキープ用 【内服】Day1-14 か°シタビ°ン錠、2,400～4,200mg/分2/day(朝夕食後<30分以内>)	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	オブジーボ点滴静注(ニホ°ルマブ°) 生理食塩液（50mL）  30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(最終濃度0.35mg/mL以上)－	360 mg/body 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（50mL）  15 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [7時後発] デキサート注射液6.6mg2mL [7時後発] 生理食塩液（100mL）  30 分かけて	1 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	オキサリプラチン点滴(エル°ラット) ブドウ糖注射液（5%500mL）  2 時間で滴下 －薬剤部調製－	130 mg/m² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法(Day2-3)：テ°カ°ロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回				