

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】Day1-14 TS-1Cap、80～120mg/分2/day(朝夕食後)	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注(ペムブロシマブ) 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(最終濃度:1～10mg/mL)－	200 mg/body １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	トラスツズマブBS注(ハセブチ)後続) 注射用水（２０mｌプラボトル） 生理食塩液（２５０mL） 30 分かけて （初回時 90分、2回目以降30分） <初回時:8mg/kg, 2回目以降:6mg/kg> (150mg製品：注水7.2mL/1Vで溶解。60mg製品：注水3mL/1Vで溶解。) －薬剤部調製－	6 mg/kg １ A １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)〔アロシ〕後発〕 デキサート注射液6.6mg2mL〔デカトロン〕後発〕 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	オキサリプラチン点滴(エルプラット)後発) ブドウ糖注射液（５％５００mｌ） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	130 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●