

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	アバスチン点滴静注(ﾊﾞｽﾃｨﾝ) 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） （90分→10：00、60分→10：30、30分→11：00） －薬剤部調製－	15 mg/kg １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ボラミン注5 m g（1mL） （腎）ガスター注射液２０m g（２０mg2ml） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｻﾞﾙﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（５０mL）  15 分かけて 11：30	１ A １ A 3 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	■アロキシ静注（0. 75mg／5mL） 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて 11：45	１ 瓶 １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	パクリタキセル注(ｷｸｼｰﾙ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ）  3 時間で滴下 12：15（※点滴ルートにインラインフィルターを使用） ＜LO:175mg/m <sup>2</sup> , L1:135mg/m <sup>2</sup> , L2:110mg/m <sup>2</sup> ＞ －薬剤部調製－	175 mg/m <sup>2</sup> １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾞﾗﾌﾟﾗﾁﾝ) ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ）  60 分かけて 15：15(max:1,000mg/body) ＜LO:AUC=5, AUC=4, L2:AUC=3＞ －薬剤部調製－	5 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：ﾃﾞｻﾞﾙﾄﾞﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回				