

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注（ヘムドリスマブ） 生理食塩液（100mL） 30 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：1～10mg/mL）－	200 mg/body 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	アバスチン点滴静注（ヘムドリスマブ） 生理食塩液（100mL） 30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） －薬剤部調製－	15 mg/kg 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	ボラミン注5mg（1mL） （腎）ガスター注射液20mg（20mg2ml） デキサート注射液6.6mg2mL [テカトロン注後発] 生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 A 1 A 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	パロノセトロン静注（0.75mg/5mL）[アロキ後発] 生理食塩液（100mL） 30 分かけて	1 瓶 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	パクリタキセル注（タキソール後発） 生理食塩液「テルモパック」（500mL） 3 時間で滴下 （※点滴ルートにインラインフィルターを使用） <L0:175mg/m ² , L1:135mg/m ² , L2:110mg/m ² > －薬剤部調製－	175 mg/m ² 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●
008 注射	カルボプラチン点滴（パワプラチン後発） ブドウ糖注射液（5%250mL） 60 分かけて （max:1,000mg/body） <L0:AUC=5, L1:AUC=4, L2:AUC=3> －薬剤部調製－	5 AUC 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：テカトロン錠（0.5mg）1回8錠、1日2回				