婦088 weekly CDDP＋ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ療法(RT併用)　34-05-0110

レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	キイトルーダ点滴静注(ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ) 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製(最終濃度:1～10mg/mL)－	200 mg/body 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
003 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
004 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)[ｱﾛｷｼ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] ブドウ糖注射液（　５%５００ｍｌ） 60　分かけて	1 瓶 1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
005 注射	マンニットールＳ注射液（３００ｍＬ） 30　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
006 注射	シスプラチン点滴静注(ﾗﾝﾀﾞ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） 2　時間で滴下 【要】遮光 <L0:40mg/㎡,L1:30mg/㎡> －薬剤部調製－	40 mg/㎡ 350 ml	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
007 注射	ラクテック注（５００ｍｌ） 90　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
008 注射	ラクテック注（５００ｍｌ） 90　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●

【レジメンコメント】
制吐療法(Day2-3、9-10、16-17)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回