





【 】眼→【 】眼		両眼の白内障手術を受けられる患者さんへ〔手術間1日〕				想定診断群(DPC):020110	
()様		主治医:				担当看護師:	
月日	/	(手術時間 :)	/	(手術時間 :)	/		
経過	入院当日(1眼目手術当日)		1眼目手術後	2眼目手術当日		退院日	
	手術前	手術後		手術前	手術後		
注射薬	・使用中の薬(飲み薬、塗り薬、貼り薬、点眼薬、注射薬、その他お薬)を入院期間分お持ちください ・緑内障の目薬は手術前までさしてください(手術後は医師の指示があるまで中止してください) ・手術予定1時間前から抗生物質の点滴があります(: から) ・指示通りにお薬を飲んでください		・翌日する手術の眼の緑内障の目薬は手術前までさしてください(手術後は医師の指示があるまでは中止してください)	・9時から手術の場合は抗生物質の点滴を手術室で行います ・手術予定1時間前から抗生物質の点滴があります(: から) ・指示通りにお薬を飲んでください		・指示通りにお薬を飲んでください	
処置	・身長と体重を測ります ・ネームバンドと識別バンドをつけます ・看護師が手術予定2時間前より目薬をさします(: から) ・手術室に行く前に入れ歯や装飾品を外し、看護師が持参した手術着に着替えてください ・2日後に手術をする眼に看護師が1日3回目薬をさします(昼食後・夕食前・寝る前)	・手術をした眼にガーゼ眼帯をつけています	・両眼に看護師が1日4回目薬をさします(朝食後・昼食後・夕食前・寝る前) ・識別バンドを付け替えます ・寝るときに前日手術をした眼にプラスチック眼帯を装着します	・看護師が手術予定2時間前より目薬をさします(: から) ・手術室に行く前に入れ歯や装飾品を外し、看護師が持参した手術着に着替えてください ・最初に手術をした眼に看護師が1日4回目薬をさします(朝食後・昼食後・夕食前・寝る前) ・寝るときに最初に手術をした眼にプラスチック眼帯を装着します	・手術をした眼にガーゼ眼帯をつけています	・ネームバンドと識別バンドをはずします ・退院後は1日4回目薬をさしてください ・手術後1週間までは寝るときにプラスチック眼帯をつけてください(/)まで	
検査			・医師の診察があります(ガーゼ眼帯をとります)			・医師の診察があります(ガーゼ眼帯をとります)	
観察	・体温・脈拍・血圧などを測ります ・眼などの症状についてお伺いします ・瞳孔の開き具合を確認します		・体温・脈拍・血圧などを帰室時・手術1時間後に測ります ・眼などの症状についてお伺いします	・体温・脈拍・血圧などを測ります ・眼などの症状についてお伺いします	・瞳孔の開き具合を確認します ・体温・脈拍・血圧などを測ります	・体温・脈拍・血圧などを帰室後・手術1時間後に測ります ・眼などの症状についてお伺いします	
活動安静	・病室内でお過ごしください ・車椅子かベッドで手術室に行きます	・手術後1時間はベッドの上で安静です ・以後は病棟の中でお過ごしください	・病院内でお過ごしください ・病棟から出る時は看護師にお知らせください	・病室内でお過ごしください ・車椅子かベッドで手術室に行きます	・手術後1時間はベッドの上で安静です ・以後は病棟の中でお過ごしください	・診察が終わるまで病棟内でお過ごしください ・飲酒、自転車や激しい運動は控えてください	
食事	・治療内容に応じたお食事となります ・午前の手術の方は午前8時までに食事を摂取してください ・病院食を提供する時間帯のみ食べることができます 以降手術まで食べることができません ・少量であれば、手術まで水分をとることができます	・手術後より水分をとることができます ・手術1時間後より気分が悪くなければ、食べることができます	・治療内容に応じたお食事となります	・病院食を提供する時間帯のみ食べることができます ・少量であれば、手術まで水分をとることができます	・手術後より水分をとることができます ・手術1時間後より気分が悪くなければ、制限はありません	・朝食まで食事ができます	
清潔	・入浴できません	・入浴できません	・首から下のシャワー浴ができます ・顔を拭くことはできます ・眼の圧迫は避けてください ・洗髪はできません ・ひげそりはできます	・入浴できません		・手術後3日目までは洗顔、洗髪ができません ・首から下の入浴ができます(ひげそりができます) ・手術後4日目(/)からは洗顔、洗髪を含めた入浴ができます ・眼のまわりのお化粧品は次回外来で主治医に確認してください	
排泄	・入院中は前日の朝の10時～翌日の朝の10時までの排尿、排便回数を教えてください ・更衣前にトイレを済ましておいてください	・手術後1時間は看護師と一緒にいきます ・以後は制限はありません ・見えにくいときは看護師がお手伝いしますのでおしらせください		・更衣前にトイレを済ましておいてください	・手術後1時間は看護師と一緒にいきます ・以後は制限はありません ・見えにくいときは看護師がお手伝いしますのでおしらせください	・基本的に午前中の退院となります 土曜日は10時以降の退院となりますのでお部屋でお待ちください ・看護師が退院薬や診察券をお渡しします ・看護師からの説明がすみましたら、1階で会計をすませしてお帰りください ・クレジットカード精算の方は後日明細書をお送りします	
説明	・看護師から手術に関する説明があります ・日常生活、仕事などについては退院までに主治医に確認をしてください			★クリアアイシールド(プラスチック眼帯)の取り扱いについて★ ・クリアアイシールド(プラスチック眼帯)が汚れた際は中性洗剤(食器用洗剤などで)洗浄し、清潔なタオルで拭いてください ・アルコール消毒はクリアアイシールド(プラスチック眼帯)に傷がつくため避けてください		★次回外来までに以下の症状が出現すれば、早めに医師に相談してください ①眼のかすみかひどくなり視力が落ちた場合 ②激しい眼の痛みの出現 ③眼脂(目やに)が異常に多い ④治療した眼を強く打ち、視力が低下した場合 ⑤眼の充血が強くなった場合	
その他	・手術に必要な同意書類、入院診療計画書は署名後に看護師へお渡し下さい ・プラスチック眼帯(2つ)・固定用テープをご用意ください 当院のコンビニで購入できます クリアアイシールド左右兼用、 優肌絆テープ(25mm)の名称で販売しております ・手術着をレンタルしてください	 	クリアアイシールド左右兼用 優肌絆テープ(25mm)	使用方法 テープを2～3cm程に切り、眼帯の上下にテープを張り付け、図のように装着してください		※眼の圧迫は避けてください	